



# OMIX<sup>®</sup> DUO / EDEGAL<sup>®</sup> DUO

Conține: 400 g/l propamocarb-clorhidrat + 50 g/l cimoxanil

Formulare: Suspensie concentrată (SC)


## Fungicid cu acțiune sistemică pentru combaterea manei la cartof

### Beneficiile oferite de OMIX<sup>®</sup> DUO

- Oferă culturilor un nivel ridicat de Protecție și de Siguranță
- Efect sistemic ridicat pentru o absorbție și translocare rapidă
- Eficiență de durată
- Două ingrediente active cu un mod de acțiune diferit și un efect sinergic ridicat
- Riscuri de rezistență reduse datorate modului de acțiune
- Alternativa Perfectă la produsele cu rezistență dezvoltată
- Potrivit pentru amestec cu alt partener pentru a lărgi aria de control a bolii (înainte se va efectua un test de compatibilitate)
- Protecție Promptă și Reziduală urmată de recolte mai mari
- Nu există nici un efect negativ asupra organismelor non-țintă (studii în domeniul GLP 2017/2018 în Țările de Jos/Olanda)
- Formulare nouă, ușor de utilizat - fără spumă în timpul operației de pulverizare

**Mod de acțiune:** OMIX<sup>®</sup> DUO este un produs sistemic, cu acțiune preventivă și curativă. Propamocarb-clorhidrat posedă o sistemicitate ridicată, având o bună distribuție în plantă. Produsul este absorbit într-un timp destul de scurt de la aplicarea tratamentului, protejând inclusiv organele noi formate. Propamocarb inhibă biosinteza fosfolipidelor și a acizilor grași și prin urmare inhibarea germinării sporilor, creșterea și pătrunderea miceliului în plante precum și blocarea dezvoltării miceliului ciupercii în planta gazda. Cimoxanilul are efect sistemic local, acționând curativ și antisporulant. Acesta este distribuit uniform și rapid în frunze, inhibând producerea și extinderea infecției precum și înmulțirea (sporularea) agentului patogen.

**Recomandări de utilizare:** OMIX<sup>®</sup> DUO oferă cele mai bune rezultate atunci când este aplicat preventiv sau în stadiu incipient de infestare, înainte ca simptomele să fie vizibile pe plante.



Culturi	Agentul dăunător	Doza (l/ha)	Utilizare	Timp de pauză
Cartof	<b>MANA</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2.5	Număr de tratamente/an: 1 Se aplică preventiv, în condiții favorabile atacului agenților patogeni sau în stadiu incipient de infestare (BBCH 20-95). Volumul de soluție: 200 - 500 l/ha	14 zile